

## Verfahren zur Konservierung und/oder Lagerung von Zellen mit Nitrilase oder Nitrilhydratase-Aktivität

### 5 Beschreibung

Die Erfindung betrifft Verfahren zur Konservierung und/oder Lagerung von Mikroorganismen, die mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweisen, wobei die Konservierung und/oder Lagerung in einem wässrigen Medium erfolgt, welches mindestens ein Aldehyd umfasst, wobei die Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l liegt.

Durch Mikroorganismen hergestellte Enzyme finden als Biokatalysatoren zunehmend Anwendung in chemischen Produktionsverfahren. Insbesondere die enzymatische Hydrolyse von Nitrilen zu Amiden, Carbonsäuren oder  $\alpha$ -Hydroxycarbonsäuren ist ein Verfahren von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Nitril-hydrolysierende Enzyme lassen sich in die Familie der Nitrilhydratasen und die Nitrilasen unterteilen. Nitrilhydratasen und Nitrilasen besitzen im aktiven Zentrum ein Cysteinmolekül das für die Katalyse essentiell ist (Levy-Schil (1995) Gene 161:15-20). Die Nitrilhydratasen katalysieren die Addition von einem Moläquivalent Wasser zu den entsprechenden Amiden. Nitrilasen katalysieren die Addition von zwei Moläquivalenten Wasser zu den entsprechenden Carbonsäuren. In der Regel bewirken besagte Enzyme eine optisch-selektive Hydratation bzw. Hydrolyse, was zu optisch-aktiven (chiralen) Produkten führt. Chirale Carbonsäuren sind gesuchte Verbindungen für die organische Synthesechemie. Sie sind Ausgangsprodukte für eine Vielzahl von pharmazeutischen Wirkstoffen oder Wirkstoffen für den Pflanzenschutz. Chirale Carbonsäuren können zur klassischen Racematspaltung über Diastereomeresalze verwendet werden. So wird R-(-)- oder S-(-)-Mandelsäure beispielsweise zur Racematspaltung racemischer Amine eingesetzt. R-(-)-Mandelsäure wird außerdem als Zwischenprodukt bei der Synthese genutzt.

Üblicherweise werden für die enzymatischen Umsetzungen gereinigte oder teilgereinigte Enzyme, aber auch Mikroorganismen mit entsprechenden Enzymaktivitäten eingesetzt. Die Enzyme können natürlichen oder rekombinanten Ursprungs sein. In der Regel erfolgt die Herstellung (Expression) der Enzyme in einem der Umlagerung vorgelagerten Schritt. Dabei ist es wünschenswert, größere Enzymmengen herzustellen und je nach Bedarf in den katalytischen Prozess einzubringen. Dies macht jedoch eine Lagerung unter Erhalt der Enzymaktivität erforderlich. Kühlung und/oder Einfrieren sind dabei Standardverfahren. Einfrieren erfordert jedoch meist komplexe Gefrier/Tau-Verfahren und geht in der Regel mit einem gra-

vierenden Verlust von Enzymaktivität einher. Kühlung im allgemeinen ist mit logistischem Aufwand und Energiekosten verbunden.

EP-A1 0 666 320 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von  $\alpha$ -Hydroxysäuren/amiden aus dem korrespondierenden Nitril, wobei vor der Reaktion die verwendeten Mikroorganismen in Gegenwart von Natriumsulfit (1 M) und Phosphatpuffer (50 mM) inkubiert werden. Zudem kann während der Reaktion die Enzymaktivität durch Zugabe von Phosphit oder Hypophosphit weiter stabilisiert werden, wobei besagte Zusätze eine Komplexierung von freiem, enzym-inhibierenden Aldehyd bewirken. EP-A1 0 610 048 beschreibt ein mikrobielles Verfahren zur Herstellung von  $\alpha$ -Hydroxysäuren, wobei die Enzymaktivität während der Reaktion durch Zugabe von Natriumsulfit stabilisiert wird, welches ebenfalls eine Komplexierung von freiem, enzym-inhibierenden Aldehyd bewirkt. Bei besagten Verfahren werden die Zusätze durchweg während der Umsetzung des Nitrils zugegeben. Verfahren zur Stabilisierung vor dem Einsatz in der Reaktion sind nicht offenbart.

20 Die typische Methode für die Erhaltung cystein-abhängiger Aktivitäten ist ein Zusatz von Dithiothreitol und/oder Mercaptoethanol und/oder Ethyldiamintetraessigsäure (Beispiel: Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* J1; Kobayashi M (1989) Eur J Biochem 182: 349-356).

25

Die Stabilisierung von Nitrilase aus *Rhodococcus* sp. ATCC 39484 wurde durch den Zusatz von Substrat (Benzonitril) erreicht (Stevenson DE (1992) Biotechnol Appl Biochem 15:283-302). Für Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* NCIB 11216 sind neben der Substratkonzentration ein basischer pH, die Temperatur und die Enzymkonzentration für die Geschwindigkeit der Stabilisierung verantwortlich (Harper BH (1976) Biochem Soc Trans 4:502-504; Harper BH (1977) Biochem J 165:309-319). Nachteilig ist hier, dass der Stabilisator durch das Enzym umgesetzt wird und so mit der Zeit seine Wirkung verliert.

Für die Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* J1 wurde der Zusatz von anorganischen Salzen (u.a. bis 20%  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ) und Alkoholen (bis 50% Glycerin, 10% Ethanol) zur Stabilisierung der Enzymaktivität beschreiben (Nagasawa T (2000) Eur J Biochem 267:138-144).

Für die Nitrilase aus *Alcaligenes faecalis* JM3 wurde der Zusatz von 60% Ammoniumsulfat, 2M NaCl oder 30% Propandiol zur Stabilisierung der Enzymaktivität beschreiben (Nagasawa T (1990) Eur J Biochem 194:765-772).

## 3

EP-A1 0 707 061 beschreibt Verfahren zur Stabilisierung von Nitrilase enthaltenen Zellen durch den Zusatz von anorganische Salzen (Phosphate, Borate, Sulfate, Sulfite, Hydrochloride) zum Lagerpuffer mit einer Konzentration von mindestens 100 mM bis zur Sättigungsgrenze.

US 4,931,391, EP-A1 0 243 967 und US 4,900,672 beschreiben die Stabilisierung einer Nitrilhydratase-Aktivität durch den Zusatz von Amiden oder Carbonsäuren (oder eine Kombination der Substanzen) zur Zellsuspension.

US 4,343,900 beschreibt ein Verfahren zur Produktion von Acrylamid aus Acrylnitril, wobei der Reaktionsmischung Alkalimetallcarbonate zugesetzt werden, um den Aktivitätsverlust beim Quellen der eingesetzten fixierten Zellen zu vermeiden.

US 6,251,646 und US 6,368,804 beschreiben Verfahren zur Stabilisierung von Nitrilaseaktivität-tragenden Mikroorganismen durch Zusatz von Ammonium-, Natrium- oder Kalium(hydrogen)carbonaten in Konzentrationen von mindestens 0,1 M bis zur Sättigungskonzentration.

Aldehyde werden aufgrund der reaktiven Aldehydgruppe als Enzym-inhibierenden Substanzen eingestuft. Ihre inhibierende Wirkung auf Nitrilasen während des Produktionsprozesses wird in zahlreichen Veröffentlichungen hervorgehoben (EP-B1 0 773 297 B1, S.4 Absätze [0013] und [0025]; EP-B1 0 707 061 B1, S.2 Absatz [0005]; EP-B1 0 666 320, S.2 Absatz [0004] und dort zitierte Literaturstellen; EP-A2 0 486 289 S.2 Zeile 30 und dort zitierte Literaturstellen; Yamamoto (1992) J Ferm Technol 73:425-430, insbesondere S.429 letzter Absatz).

Die Deaktivierung der Nitrilase / Nitrilhydratase-Aktivität bei der Lagerung ist ein wesentlicher Kostenfaktor bei der industriellen Nutzung besagter Enzyme. Die Aktivität nimmt beispielsweise bei 4°C und pH 6,0 über einen Zeitraum von 6,6 Tagen um 36 % ab, was einen Aktivitätsverlust von 5,5 % pro Tag bedeutet (vgl. Fig. 1; Vergleichsversuch in Beispiel 3). Ein Aktivitätsverlust bei Nitrilasen kann z.B. auf einen Zerfall des Enzymmultimers in seine Monomere beruhen, die keine Nitrilaseaktivität besitzen (Nagasawa T (1990) Eur J Biochem 194:765-772). Die beschriebenen Verfahren sind nur sehr begrenzt in der Lage dieses Problem zu lösen. Zudem nutzen besagte Verfahren hohe Konzentrationen an Zusatzstoffen für eine Stabilisierung der Biokatalysatoren, die zudem nach Verwendung des Biokatalysators aufwendig abgetrennt und entsorgt werden müssen.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe bestand demnach darin, ein Verfahren bereitzustellen, dass eine möglichst langanhaltende Stabilisierung einer Nitrilase / Nitrilhydratase Aktivität ermöglicht ohne das Reaktionsgemisch mit unerwünschten Begleitstoffen zu kontaminieren.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren wird diese Aufgabe gelöst.

Ein erster Schritt der Erfindung betrifft Verfahren zur Konservierung und/oder Lagerung von Mikroorganismen, die mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweisen, wobei die Konservierung und/oder Lagerung in einem wässrigen Medium erfolgt, welches mindestens ein Aldehyd umfasst, wobei die Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l liegt.

Besagter Konservierungsschritt wird bevorzugt durchgeführt, bevor die Zellen mit einem Reaktanten, dessen Reaktion durch die Zellen zu katalysieren ist, versetzt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst das wässrige Medium eine Gesamtkonzentration an Cyanidverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Nitrilen, Blausäure und Cyanidsalzen, die maximal 10 Mol-% der Gesamtaldehydkonzentration beträgt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthält das zur Konservierung und/oder Lagerung geeignete wässrige Medium keine Zusätze an besagten Cyanidverbindungen.


Der Begriff "Aldehyd" ist breit zu verstehen und umfasst sowohl aliphatische als auch aromatische Aldehyde. In einer bevorzugten Ausführungsform meint Aldehyd Verbindungen der allgemeinen Formel III:



wobei R<sup>6</sup> substituiertes oder unsubstituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C1-C10-Alkyl-, C2-C10-Alkenyl-, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl- oder Hetaryl- sein kann. Besonders bevorzugt sind aromatische Aldehyde, ganz besonders bevorzugt unsubstituierter Benzaldehyd und substituierte Benzaldehyde, wie beispielsweise o-Chlorbenzaldehyd, m-Chlorbenzaldehyd, p-Chlorbenzaldehyd, o-Brombenzaldehyd, m-Brombenzaldehyd, p-Brombenzaldehyd, o-Methylbenzaldehyd, m-Methylbenzaldehyd, p-Methylbenzaldehyd.

## 5

Die konservierten/gelagerten Mikroorganismen können beispielsweise zur Umsetzung von racemischen Nitrilen der allgemeinen Formel (II) zu chiralen Carbonsäuren der allgemeinen Formel (Ia) oder chiralen Amiden der Allgemeinen Formel (Ib) eingesetzt werden:



\* ein optisch aktives Zentrum

15  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$ ,  $\text{R}^3$  unabhängig voneinander Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C1-C10-Alkyl-, C2-C10-Alkenyl-, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl-, Hetaryl-,  $\text{OR}^4$  oder  $\text{NR}^4\text{R}^5$  und wobei die Reste  $\text{R}^1$ ,  $\text{R}^2$  und  $\text{R}^3$  immer unterschiedlich sind,

20

$\text{R}^4$  Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C1-C10-Alkyl-, C2-C10-Alkenyl-, C1-C10-Alkylcarbonyl-, C2-C10-Alkenylcarbonyl-, Aryl-, Arylcarbonyl-, Hetaryl- oder Hetarylcarbonyl-,


25

$\text{R}^5$  Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C1-C10-Alkyl-, C2-C10-Alkenyl-, Aryl- oder Hetaryl-.

30 Als Nitril am meisten bevorzugt sind Mandelonitril, o-Chlormandelonitril, p-Chlormandelonitril, m-Chlormandelonitril, o-Brommandelonitril, p-Brommandelonitril, m-Brommandelonitril, o-Methylmandelonitril, p-Methylmandelonitril oder m-Methylmandelonitril. Als chirale Carbonsäure sind am meisten bevorzugt R-Mandelsäure, S-Mandelsäure, R-p-Chlormandelsäure, S-p-Chlormandelsäure, R-m-Chlormandelsäure, S-m-Chlormandelsäure, R-o-Chlormandelsäure, S-o-Chlormandelsäure, S-o-Brommandelsäure, S-p-Brommandelsäure, S-m-Brommandelsäure, S-o-Methylmandelsäure, S-p-Methylmandelsäure, S-m-Methylmandelsäure, R-o-Brommandelsäure, R-p-Brommandelsäure, R-m-Brommandelsäure, R-o-Methylmandelsäure, R-p-Methylmandelsäure oder R-m-Methylmandelsäure.

Werden als Edukt für die angestrebte Nitrilase/Nitrilhydratase katalysierte Umsetzung  $\alpha$ -Hydroxynitrile der allgemeinen Formel (IV) eingesetzt (wobei für  $\text{R}^6$  die gleiche Definition wie in der allgemeinen Formeln III gilt),

45



5 so ist der zur Konservierung/Lagerung eingesetzte Aldehyd bevorzugt der gleiche Aldehyd, der durch Umsetzung mit Blausäure oder Cyanid besagtes  $\alpha$ -Hydroxynitril ergibt, d.h. der Rest  $\text{R}^6$  in den allgemeinen Formeln III und IV ist bevorzugt identisch gewählt.

10 Die Gesamtkonzentration an Aldehyden in dem zur Konservierung und/oder Lagerung geeignete wässrige Medium beträgt 0,1 bis 100 mM/l, bevorzugt 0,2 bis 50 mM/l, besonders bevorzugt 0,5 bis 10 mM/l, ganz besonders bevorzugt 0,3 bis 5 mM/l, am meisten bevorzugt 0,4 bis 2 mM/l.

15 Das wässrige Medium kann einen neutralen, schwach basischen oder schwach sauren pH-Wert annehmen. Entsprechend liegt der pH in einem Bereich von pH 6 bis 8, bevorzugt pH 6,5 bis 7,5. Die Konservierungstemperatur liegt bevorzugt in einem Bereich von 0 bis  
20 40°C, besonders bevorzugt 1 bis 10°C, ganz besonders bevorzugt 2 bis 5°C.

Das erfindungsgemäße Verfahren erwies sich sowohl unter Labor- als auch unter Produktionsbedingungen als außerordentlich geeignet,  
25 net, eine langanhaltende Enzymaktivität zu gewährleisten. Der Biokatalysator zeigt keine Deaktivierung innerhalb der beobachteten 37 Tage.

"Mikroorganismus" meint im Rahmen dieser Erfindung gram-positive  
30 oder gram-negative Bakterien.

Bevorzugt sind alle Gattungen und Arten der Enterobacteriaceae oder Familien und der Ordnung Actinomycetales, ganz besonders bevorzugt die Enterobacteriaceae Arten Escherichia, Serratia,  
35 Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Edwardsiella, Citrobacter, Morganella, Providencia und Yersinia.

Ferner bevorzugt sind die Arten Pseudomonas, Burkholderia, Nocardia, Acetobacter, Gluconobacter, Corynebacterium, Brevibacterium,  
40 Bacillus, Clostridium, Cyanobacter, Staphylococcus, Aerobacter, Alcaligenes, Rhodococcus und Penicillium.

Am meisten bevorzugt sind Escherichia Arten, insbesondere Escherichia coli.

Während des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der Mikroorganismus in einem wachsenden, ruhenden, immobilisierten oder aufgeschlossenen Zustand vorliegen. Unter aufgeschlossenen Zellen sind beispielsweise Zellen zu verstehen, die über eine Behandlung mit  
5 beispielsweise Lösungsmitteln durchlässig gemacht worden sind, oder Zellen, die über eine Enzymbehandlung, über eine mechanische Behandlung (z. B. French Press oder Ultraschall) oder über eine sonstige Methode aufgebrochen wurden. Die so erhaltenen Rohextrakte sind für das erfindungsgemäße Verfahren vorteilhaft geeignet.  
10 gnet. Auch partiell oder vollständig gereinigte Enzympräparationen können für das Verfahren verwendet werden. Ebenfalls geeignet sind immobilisierte Mikroorganismen oder Enzyme, die vorteilhaft in der Reaktion Anwendung finden können. Die Immobilisierung kann beispielsweise durch Zugabe eines oder mehrerer Acrylmonomere  
15 (wie z.B. Acrylamid, Acrylsäure, Methacrylamid, Methacrylsäure, N,N-Dimethylacrylamid, N,N-Diethylacrylamid, Dimethylaminopropylacrylat, Dimethylaminopropylmethacrylat, Dimethylaminopropylacrylamid, Dimethylaminopropylmethacrylamid, Diethylaminopropylacrylamid oder Diethylaminopropylmethacrylamid) sowie gegebenenfalls  
20 einem oder mehrerer Vernetzern (wie z.B. Methylenbisacrylamid, Methylenbismethacrylamid, 1,2-Dihydroxyethylenbisacrylamid oder Bisacrylamidoessigsäure) zu der Zell- oder Enzympräparation und anschließende radikalische Polymerisation (initiiert durch z.B. Ammoniumpersulfate) realisiert werden.

25 Um einen Befall mit Fremdbakterien oder Pilzen zu verhindern können der Konservierungs/Lagerlösung gegebenenfalls geeignete Wirkstoffe mit antibakterieller oder fungizider Wirkung oder andere Salze wie z.B. Ethylenediaminetetraessigsäure zugesetzt werden.

30 Die in erfindungsgemäßen Verfahren zum Einsatz kommenden Mikroorganismen können - vor der Konservierung/lagerung - in einem Medium, dass das Wachstum dieser Organismen ermöglicht, gezüchtet werden. Dieses Medium kann ein synthetisches oder ein natürliches  
35 Medium sein. Je nach Organismus werden dem Fachmann bekannte Medien verwendet. Für das Wachstum der Mikroorganismen enthalten die verwendeten Medien eine Kohlenstoffquelle, eine Stickstoffquelle, anorganische Salze und gegebenenfalls geringe Mengen an Vitamine und Spurenelemente.

40 Vorteilhafte Kohlenstoffquellen sind beispielsweise Polyole wie Glycerin, Zucker wie Mono-, Di- oder Polysaccharide wie Glucose, Fructose, Mannose, Xylose, Galactose, Ribose, Sorbose, Ribulose, Laktose, Maltose, Saccharose, Raffinose, Stärke oder Cellulose,  
45 komplexe Zuckerquellen wie Melasse, Zuckerphosphate wie Fructose-1,6-bisphosphat, Zuckeralkohole wie Mannit, Alkohole wie Methanol oder Ethanol, Carbonsäuren wie Citronensäure, Milchsäure

oder Essigsäure, Fette wie Sojaöl oder Rapsöl, Aminosäuren wie ein Aminosäurengemisch beispielsweise sog. Casamino acids (Difco) oder einzelne Aminosäuren wie Glyzin oder Asparaginsäure oder Amino Zucker, die letztgenannten können auch gleichzeitig als

5 Stickstoffquelle verwendet werden. Besonders bevorzugt sind Polyole, insbesondere Glycerin.

Vorteilhafte Stickstoffquellen sind organische oder anorganische Stickstoffverbindungen oder Materialien, die diese Verbindungen

10 enthalten. Beispiele sind Ammoniumsalze wie  $\text{NH}_4\text{Cl}$  oder  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ , Nitrate, Harnstoff, oder komplexe Stickstoffquellen wie Maisquellwasser, Bierhefeautolysat, Sojabohnenmehl, Weizengluten, Hefeextrakt, Pepton, Fleischextrakt, Caseinhydrolysat, Hefe oder Kartoffelprotein, die häufig auch gleichzeitig als Stickstoffquelle

15 dienen können.

Beispiele für anorganische Salze sind die Salze von Calcium, Magnesium, Natrium, Kobalt, Molybdän, Mangan, Kalium, Zink, Kupfer und Eisen. Als Anion dieser Salze sind besonders das

20 Chlor-, Sulfat- und Phosphation zu nennen. Ein wichtiger Faktor zur Steigerung der Produktivität im erfindungsgemässen Verfahren ist die Kontrolle der  $\text{Fe}^{2+}$ - oder  $\text{Fe}^{3+}$ -Ionenkonzentration im Produktionsmedium.

Gegebenenfalls werden dem Nährmedium weitere Wachstumsfaktoren zugesetzt, wie beispielsweise Vitamine oder Wachstumsförderer wie Biotin, 2-KLG, Thiamin, Folsäure, Nicotinsäure, Pantothenat oder Pyridoxin, Aminosäuren wie Alanin, Cystein, Prolin, Asparaginsäure, Glutamin, Serin, Phenylalanin, Ornithin oder Valin, Car-

30 bonsäuren wie Citronensäure, Ameisensäure, Pimelinsäure oder Milchsäure, oder Substanzen wie Dithiothreitol.

Das Mischungsverhältnis der genannten Nährstoffe hängt von der Art der Fermentation ab und wird im Einzelfall festgelegt. Die

35 Mediumkomponenten können alle zu Beginn der Fermentation vorgelegt werden, nachdem sie falls erforderlich getrennt sterilisiert oder gemeinsam sterilisiert wurden, oder aber je nach Bedarf während der Fermentation kontinuierlich oder diskontinuierlich nach-

40

Die Züchtungsbedingungen werden so festgelegt, dass die Organismen so wachsen, dass die bestmöglichen Ausbeuten (zu ermitteln beispielsweise durch die Aktivitätsmenge des exprimierten rekombinanten Proteins) erreicht werden. Bevorzugte Züchtungstemperaturen liegen bei  $15^\circ\text{C}$  bis  $40^\circ\text{C}$ . Besonders vorteilhaft sind Temperaturen zwischen  $25^\circ\text{C}$  und  $37^\circ\text{C}$ . Vorzugsweise wird der pH-Wert in einem Bereich von 3 bis 9 festgehalten. Besonders vorteilhaft sind

45



pH-Werte zwischen 5 und 8. Im allgemeinen ist eine Inkubationsdauer von wenigen Stunden bis zu einigen Tagen bevorzugt von 8 Stunden bis zu 21 Tagen, besonders bevorzugt von 4 Stunden bis 14 Tagen ausreichend.

5

Wie Medien vorteilhaft optimiert werden können, kann der Fachmann beispielsweise dem Lehrbuch Applied Microbiol Physiology, "A Practical Approach (Eds. PM Rhodes, PF Stanbury, IRL-Press, 1997, S.53-73, ISBN 0 19 963577 3) entnehmen.

10

Der Aldehyd kann zur Konservierung/Lagerung vor, während oder nach der Züchtung der Mikroorganismen zugesetzt werden. So ist es beispielsweise möglich einen maximalen Erhalt der Aktivität zu erreichen, indem der Aldehyd dem Fermentationsansatz - ohne wei-

15 tere Separation der Mikroorganismen - zugesetzt wird.


Es ist jedoch ebenfalls möglich, die so gezüchteten mikrobiellen Zellen oder Mikroorganismen beispielsweise durch Zentrifugation von dem Kulturmedium zu separieren, optional ein oder mehrmals

20 mit einem geeigneten Puffer (wie z.B. Borat- oder Phosphatpuffer) zu waschen und anschließend zur Lagerung/Konservierung in der wässrigen Lösung, die mindestens ein Aldehyd umfassen, aufzunehmen bzw. zu bzw. resuspendieren. Die Konzentration der Mikroorganismen kann in besagter wässrigen Lösung umfassend mindestens ein  
25 Aldehyd beliebig gewählt werden.

Die Mikroorganismen, die im Rahmen der Erfindung zum Einsatz kommen weisen mindestens eine Nitrilhydratasae und/oder Nitrilase-Aktivität auf.


30

"Nitrilhydratase"-Aktivität meint allgemein die Eigenschaft, die Addition von einem Moläquivalent Wasser an ein Nitril zu dem entsprechenden Amid zu katalysieren:



Nitrilhydratasen umfassen bevorzugt Enzyme der EC-Klasse 4.2.1.84 (Nitrilhydratasen).

40 "Nitrilase"-Aktivität meint allgemein die Eigenschaft, die Addition von zwei Moläquivalenten Wasser an ein Nitril zu der entsprechenden Carbonsäure zu katalysieren:



45

## 10

Nitrilasen umfassen bevorzugt Enzyme der EC-Klassen 3.5.5.1 (Nitrilasen), 3.5.5.2 (Ricininnitrilase), 3.5.5.4 (Cyanoalaninnitrilasen), 3.5.5.5 (Arylacetonitrilasen), 3.5.5.6 (Bromoxynilnitrilasen), 3.5.5.7 (Aliphatische Nitrilasen).

5

Die Nitrilase und/oder Nitrilhydratase-Aktivität der besagten Mikroorganismen Zellen kann natürlichen oder rekombinanten Ursprungs sein.

- 10 "Natürlichen Ursprungs" meint dabei, dass der Mikroorganismus als solcher - ohne eine durch menschliches Handeln bewirkte genetische Änderung - eine entsprechende Nitrilase und/oder Nitrilhydratase-Aktivität aufweist. Zahlreiche derartiger Mikroorganismen sind dem Fachmann bekannt. Bevorzugt sind insbesondere Mikroorganismen der Gattungen *Rhodococcus* und *Gordona*, wie beispielsweise *Rhodococcus* sp. HT40-6 (FERM BP-5231), *Rhodococcus rhodochrous* ATCC 33278, *Rhodococcus rhodochrous* J-1 (FERM BP-1478), *Gordona terrae* MA-1 (FERM BP-4535) (JP-A-4-222591, JP-B-6-55148, EP-A1 0 707 061).

20

- "Rekombinanten Ursprungs" meint dabei, dass die DNA-Sequenz kodierend für ein Enzym mit Nitrilase und/oder Nitrilhydratase-Aktivität aus einem Mikroorganismus isoliert und in einem Mikroorganismus einer anderen Art exprimiert wird. Dem Fachmann sind zahlreiche Sequenzen kodierend für Enzyme Nitrilase und/oder Nitrilhydratase-Aktivität bekannt. Beispielhaft jedoch nicht einschränkend seien zu nennen:

1. Nitrilase aus *Acidovorax facilis* 72W (Gavagan JE et al. (1999) *Appl Microbiol Biotechnol* 52:654-659)
2. Nitrilase aus *Acinetobacter* sp. AK 226 (Yamamoto K und Komatsu K (1991) *Agric Biol Chem* 55(6):1459-1466)
3. Nitrilase aus *Acinetobacter* sp. RFB1 (Finnegan I et al. (1991) *Appl Microbiol Biotechnol* 36:142-144)
- 35 4. Nitrilase aus *Alcaligenes faecalis* ATCC 8750 (Yamamoto K et al. (1991) *Appl Environ Microbiol* 57(10):3028-3032)
5. Nitrilase aus *Alcaligenes faecalis* JM3 (Nagasawa T et al. (1990) *Eur J Biochem* 194:765-772)
6. Nitrilasen (NIT1/NIT2/NIT3) aus *Arabidopsis thaliana* (Vorwerk S et al. (2001) *Planta* 212:508-516)
- 40 7. Nitrilase aus *Arthrobacter* sp. J-1 (Bandyopadhyay AK et al. (1986) *Appl Environ Microbiol* 51(2):302-306)
8. Nitrilase aus *Bacillus pallidus* Dac521 (Cramp R et al. (1997) *Microbiology* 143:2313-2320)
- 45 9. Nitrilase aus *Comamonas* sp. NI1 (Cerbelaud E et al. (1996) *Ind Chem Libr* 8:189-200)

## 11

10. Nitrilase aus *Comamonas testosteroni* sp. (Levy-Schil S et al. (1995) *Gene* 161:15-20)
11. Nitrilase aus *Fusarium oxysporum* f. sp. *melonis* (Goldlust A und Bohak Z (1989) *Biotechnol Appl Biochem* 11:581-601)
- 5 12. Nitrilase aus *Fusarium solani* (Harper BH (1977) *Biochem J* 167:685-692)
13. Nitrilase aus *Klebsiella ozaenae* (McBride KE et al. (1986) *Appl Environ Microbiol* 52(2):325-330)
14. Nitrilase aus *Pseudomonas fluoreszenz* DSM 7155 (Layh N et al. (1998) *J Mol Catal B: Enzym* 5:467-474)
- 10 15. Nitrilase aus *Pseudomonas* sp. (Layh N et al. (1992) *Arch Microbiol* 158:405-411)
16. Nitrilase aus *Pseudomonas* sp. (S1) (Dhillon J et al. (1999) *Can J Microbiol* 45: 811-815)
- 15 17. Nitrilase aus *Pseudomonas* sp. 13 (Yanase H et al. (1982) *Agric Biol Chem* 46:2925)
18. Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* J1 (Kobayashi M et al. (1989) *Eur J Biochem* 182:349-356)
19. Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* K22 (Kobayashi M et al. (1990) *J Bacteriol* 172(9):4807-4815)
- 20 20. Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* NCIB 11215 (Harper BH (1985) *Int J Biochem* 17(6):677-683)
21. Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* NCIB 11216 (Harper BH (1977) *Biochem J* 165:309-319)
- 25 22. Nitrilase aus *Rhodococcus rhodochrous* PA34 (Bhalla TC et al. (1992) *Appl Microbiol Biotechnol* 37:184-190)
23. Nitrilase aus *Rhodococcus* sp. ATCC 39484 (Stevenson DE et al. (1992) *Biotechnol Appl Biochem* 15:283-302)

30 In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Nitrilase beschrieben durch eine Aminosäuresequenz, die kodiert wird durch eine Nukleinsäuresequenz ausgewählt aus der Gruppe

- a) einer Nukleinsäuresequenz mit der in SEQ ID NO: 1 dargestellten Sequenz,
- 35 b) Nukleinsäuresequenzen, die sich als Ergebnis des degenerierten genetischen Codes von der in SEQ ID NO: 1 dargestellten Nukleinsäuresequenz ableiten,
- 40 c) Derivate der in SEQ ID NO: 1 dargestellten Nukleinsäuresequenz, die für Polypeptide mit der in SEQ ID NO: 2 dargestellten Aminosäuresequenzen kodieren und mindestens 35% Homologie auf Aminosäureebene aufweisen und befähigt sind,
- 45 mindestens ein Nitril zu der entsprechenden Carbonsäure umzusetzen.

## 12

Die Expression rekombinanter Nitrilasen/Nitrilhydrataseen kann beispielsweise mittels eines geeigneten in den Mikroorganismus eingeführten DNA-Konstruktes realisiert werden. Bevorzugt handelt es sich bei dem DNA-Konstrukt um einen Vektor. Vektoren können  
5 beispielhaft Plasmide, Cosmide oder Phagen sein. Bevorzugt ist der Vektor eine zirkuläres Plasmid, das die zu exprimierende Nukleinsäuresequenz in rekombinanter Form umfasst und zu autonomer Replikation in der prokaryotischen Wirtzelle befähigt ist. Als Vektoren seien beispielhaft zu nennen:

10

a) in E.coli sind bevorzugt pQE70, pQE60 und pQE-9 (QIAGEN, Inc.); pBluescript Vektoren, Phagescript Vektoren, pNH8A, pNH16a, pNH18A, pNH46A (Stratagene Cloning Systems, Inc.); ptrc99a, pKK223-3, pKK233-3, pDR540, pRIT5 (Pharmacia Bio-  
15 tech, Inc.); pLG338, pACYC184, pBR322, pUC18, pUC19, pKC30, pRep4, pHS1, pHS2, pPLc236, pMBL24, pLG200, pUR290, pIN-III<sup>113</sup>-B1,  $\lambda$ gt11 oder pBdCI,

15

b) in Streptomyces sind bevorzugt pIJ101, pIJ364, pIJ702 oder  
20 pIJ361,

20

c) in Bacillus sind bevorzugt pUB110, pC194 oder pBD214,

d) in Corynebacterium pSA77 oder pAJ667,

25

oder Derivate der vorstehend genannten Plasmide. Die genannten Plasmide stellen eine kleine Auswahl der möglichen Plasmide dar. Weitere Plasmide sind dem Fachmann wohl bekannt und können beispielsweise aus dem Buch Cloning Vektors (Eds. Pouwels P. H. et  
30 al. Elsevier, Amsterdam-New York-Oxford, 1985, ISBN 0 444 904018) entnommen werden.

30

Das DNA-Konstrukt umfaßt mindestens eine zu exprimierenden Nukleinsäuresequenz kodierend für ein Enzym mit Nitrilase und/  
35 oder Nitrilhydratase-Aktivität in funktioneller Verknüpfung mit einem in den jeweilig verwendeten Mikroorganismus funktionellen Promotor.

Zahlreiche in Mikroorganismen funktionelle Promotoren sind dem  
40 Fachmann bekannt: Beispielhaft seien Promotoren wie cos-, tac-, trp-, tet-, lpp-, lac-, lacIq-, T7-, T5-, T3-, gal-, trc-, ara-, rha-, SP6-,  $\lambda$ -PR- oder  $\lambda$ -PL-Promotor zu nennen. Besonders bevorzugt ist der Promotor des Rhamnose-Operons (rha-Promotor) aus E.coli, der durch Zugabe von Rhamnose induziert werden kann.

45

## 13

Unter einer funktionellen Verknüpfung versteht man allgemein eine Anordnung in der eine genetische Kontrollsequenz (z.B. ein Promotor) ihre Funktion in Bezug auf die zu exprimierende Nukleinsäuresequenz ausüben kann. Funktion kann dabei beispielsweise die

5 Kontrolle der Expression d.h. Transkription und/oder Translation der Nukleinsäuresequenz bedeuten. Kontrolle umfasst dabei beispielsweise die Initiierung, Steigerung, Steuerung oder Suppression der Expression d.h. Transkription und ggf. Translation. Unter einer funktionellen Verknüpfung versteht man zum Beispiel die

10 sequentielle Anordnung eines Promoter, der zu exprimierenden Nukleinsäuresequenz und ggf. weiterer regulativer Elemente wie zum Beispiel einem Terminator derart, dass jedes der regulativen Elemente seine Funktion bei der Expression der Nukleinsäuresequenz erfüllen kann. Dem Fachmann sind verschiedene Wege bekannt,

15 um zu einem der erfindungsgemässen DNA-Konstrukte zu gelangen. Die Herstellung kann mittels gängiger Rekombinations- und Klonierungstechniken realisiert werden, wie sie beispielsweise in T Maniatis, EF Fritsch und J Sambrook, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor,

20 NY (1989) sowie in TJ Silhavy, ML Berman und LW Enquist, Experiments with Gene Fusions, Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY (1984) und in Ausubel, FM et al., Current Protocols in Molecular Biology, Greene Publishing Assoc. and Wiley Interscience (1987) beschrieben sind.

25 Besagtes DNA-Konstrukt kann weitere Funktionselemente enthalten. Der Begriff der Funktionselemente ist breit zu verstehen und meint all solche Sequenzen, die einen Einfluss auf das Zustandekommen, die Vermehrung oder Funktion der erfindungsgemässen DNA-

30 Konstrukte oder Organismen haben. Funktionselemente gewährleisten, verstärken, regulieren oder modifizieren zum Beispiel die Transkription und gegebenenfalls Translation in entsprechenden Wirtsorganismen.

35 Funktionselemente sind beispielsweise beschrieben bei "Goeddel; Gene Expression Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, CA (1990)" oder "Gruber and Crosby, in: Methods in Plant Molecular Biology and Biotechnology, CRC Press, Boca Raton, Florida, eds.: Glick and Thompson, Chapter 7, 89-108" sowie

40 den dort aufgewiesenen Zitaten. Je nach nachstehend näher beschriebenen Wirtsorganismus oder Ausgangsorganismus, der durch Einbringen der Expressionskassetten oder Vektoren in einen genetisch veränderten oder transgenen Organismus überführt wird, eignen sich verschiedene Kontrollsequenzen.

"Genetische Kontrollsequenzen" umfassen beispielsweise die 5'-untranslatierte Region oder die nichtkodierende 3'-Region von Genen. "Genetische Kontrollsequenzen" meint ferner Sequenzen, die für Fusionsproteine bestehend aus einer Signalpeptidsequenz 5 kodieren. Beispielhaft aber nicht einschränkend seien zu nennen:

a) Selektionsmarker

Selektionsmarker sind in der Regel erforderlich, um erfolgreich transformierte Zellen zu selektionieren und den Verlust des DNA-Konstruktes aus der Wirtszelle im Laufe der Zeit und der Zellteilungen zu verhindern. Ein solcher Verlust kann insbesondere dann auftreten, wenn das durch die zu exprimierende Nukleinsäuresequenz kodierte rekombinante Protein einen toxischen Effekt auf den prokaryontischen Organismus hat. Der mit dem Expressionskonstrukt eingebrachte selektionierbaren Marker verleiht den erfolgreich transformierten Zellen eine Resistenz gegen ein Biozid (zum Beispiel ein Antibiotikum wie zum Beispiel Ampicillin, Kanamycin oder Hygromycin) verleiht. Beispielhaft als Selektionsmarker seien genannt:

20

- Amp (Ampicillin-Resistenz; b-Lactamase)
- Cab (Carbenicillin-Resistenz)
- Cam (Chloramphenicol-Resistenz)
- Kan (Kanamycin-Resistenz)
- 25 - Rif (Rifampicin-Resistenz)
- Tet (Tetracyclin-Resistenz)
- Zeo (Zeocin-Resistenz)
- Spec (Spectinomycin)

30

Der Selektionsdruck wird durch entsprechende Mengen des Antibiotikums aufrechterhalten. Beispielhaft seien zu nennen: Ampicillin 100 mg/l, Carbenicillin 100 mg/l, Chloramphenicol 35 mg/l, Kanamycin 30 mg/l, Rifampicin 200 mg/l, Tetracyclin 12,5 mg/l, Spectinomycin 50 mg/l.

35

Selektionsmarker umfassen ferner solche Gene und Genprodukte, die beispielsweise durch Komplementierung einer genetischen Defizienz in der Aminosäure- oder Nukleotidsynthese, eine Selektion einer entsprechend transformierten Wirtszelle ermöglichen. Dazu werden i.a. Medien eingesetzt, die besagte Aminosäure oder den besagten Nukleotidbaustein nicht enthalten. Verschiedene derartige Systeme sind dem Fachmann bekannt. Beispielhaft seien die Defizienzen in der Tryptophan (z.B. trpC), Leucin (z.B. leuB), Histidin (z.B. hisB) Biosynthese zu nennen, wie sie z.B. im E.coli Stamm KC8 (Clontech) vorliegen. Diese Defizienzen können u.a. durch die

45

## 15

selektionierbaren Marker TRP1, Leu2 und HIS3 komplementiert werden.

- b) Transkriptionsterminatoren  
5 Der Transkriptionsterminator vermindert eine ungewollte Transkription und erhöht die Plasmid- und mRNA Stabilität.
- c) Shine-Dalgarno Sequenzen  
10 Eine Shine-Dalgarno (SD) Sequenz ist erforderlich für die Initiation der Translation und ist komplementär zum 3'-Ende der 16S ribosomalen RNA. Die Effizienz der Initiation der Translation am Start-Kodon hängt von der tatsächlichen Sequenz ab. Eine geeignete Konsensussequenz für E.coli ist beispielhaft: 5'-TAAGGAGG-3'. Sie ist ca. 4 bis 14 Nukleotide  
15 stromaufwärts des Startkodons lokalisiert, wobei das Optimum bei 8 Nukleotiden liegt. Um die Ausbildung von Sekundärstrukturen zu vermeiden (welche die Expression reduzieren können), sollte diese Region bevorzugt reich an A/T-Nukleotiden sein.
- 20 d) Startkodon  
Das Startkodon ist der Initiationpunkt der Translation. In E. coli ist ATG das meist genutzte Startkodon; GTG kann alternativ auch genutzt werden.
- 25 e) "Tags" und Fusionsproteine  
N- oder C-terminale Fusionen der zu exprimierenden rekombinanten Proteine mit kürzeren Peptiden ("Tags") oder anderen Proteinen (Fusionpartnern) können vorteilhaft sein. Sie können beispielsweise eine verbesserte Expression, Löslichkeit,  
30 Detektierbarkeit und Aufreinigung ermöglichen. Bevorzugt werden derartige Fusionen mit Protease-Spaltsequenzen (z.B. für Thrombin oder Faktor X) kombiniert, die eine Entfernung des "Tags" bzw. des Fusionspartners nach der Expression und Aufreinigung ermöglichen.  
35
- f) Multiple Klonierungsregionen (Multiple cloning site; MCS) erlauben und erleichtern die Insertion einer oder mehrerer Nukleinsäuresequenzen.
- 40 g) Stop-Kodon / Translationsterminatoren  
Von den drei möglichen Stopp-Kodons ist TAA bevorzugt, da es bei TAG und TGA unter Umständen zu einem "Durchlesen" ("Read-Through") ohne Abbruch der Translation kommen kann. Es können auch mehrere Stopp-Kodons infolge eingesetzt werden um eine  
45 verlässliche Termination zu gewährleisten.

## h) Reportergene

Reportergene kodieren für leicht quantifizierbare Proteine, die über Eigenfarbe oder Enzymaktivität eine Bewertung der Transformationseffizienz, der Expressionshöhe, des Expressionssortes oder -zeitpunktes gewährleisten. Reportergene können z.B. für nachfolgende Proteine kodieren: Hydrolasen, Fluoreszenzproteine, Biolumineszproteine, Glucosidasen oder Peroxidasen. Bevorzugt sind Luciferasen,  $\beta$ -Galactosidasen,  $\beta$ -Glucuronidase, "Green Fluorescence Protein", Acetyl-, Phospho- oder Adenyltransferasen (siehe auch Schenborn E, Groskreutz D (1999) Mol Biotechnol 13(1):29-44).

Die Herstellung eines transformierten Mikroorganismus erfordert, dass die entsprechende DNA (beispielsweise eine der erfindungsgemäßen Expressionskassetten oder Vektoren) in die entsprechende Wirtszelle eingebracht wird. Für diesen Vorgang, der als Transformation bezeichnet wird, steht eine Vielzahl von Methoden zur Verfügung (siehe auch Keown et al. (1990) Methods in Enzymology 185:527-537). So kann die DNA beispielhaft direkt durch Mikroinjektion, Elektroporation oder durch Bombardierung mit DNA-beschichteten Mikropartikeln (biolistische Verfahren mit der Genkanone "particle bombardment") eingeführt werden. Auch kann die Zelle chemisch, zum Beispiel mit Polyethylenglycol, permeabilisiert werden, so dass die DNA durch Diffusion in die Zelle gelangen kann. Die DNA kann auch durch Fusion mit anderen DNA-enthaltenden Einheiten wie Minicells, Zellen, Lysosomen oder Liposomen erfolgen. Elektroporation ist eine weitere geeignete Methode zur Einführung von DNA, bei der die Zellen reversibel durch einen elektrischen Impuls permeabilisiert werden. Als bevorzugte allgemeine Methoden seien zu nennen Calciumphosphat vermittelte Transformation, DEAE-Dextran vermittelte Transformation, kationische Lipid-vermittelte Transformation, Elektroporation, Transduktion, Infektion. Derartige Verfahren sind dem Fachmann geläufig und beispielsweise beschrieben (Davis et al. (1986) Basic Methods In Molecular Biology; Sambrook J et al. (1989) Molecular cloning: A laboratory manual, Cold Spring Harbor Laboratory Press; Ausubel FM et al. (1994) Current protocols in molecular biology, John Wiley and Sons; Glover DM et al. (1995) DNA Cloning Vol.1, IRL Press ISBN 019-963476-9).

Transformierte Zellen d.h. solche, die die eingeführte DNA enthalten, können von untransformierten selektioniert werden, wenn ein selektionierbarer Marker Bestandteil der eingeführten DNA ist. Verschiedene Selektionsmarker sind oben beschrieben.



## 17

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft eine Zubereitung von Mikroorganismen, die mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweisen, wobei die Zubereitung umfasst

- 5 a) mindestens ein Aldehyd mit einer Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l, und
- b) Cyanidverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Nitrilen, Blausäure und Cyanidsalzen, in einer Gesamtkonzentration, die maximal 10 Mol-% der Gesamtaldehydkonzentration beträgt.
- 10

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Zubereitung keine Zusätze an besagten Cyanidverbindungen.

15

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung betrifft die Verwendung der erfindungsgemäßen Zubereitung von Mikroorganismen zur Herstellung von Nahrungs- oder Futtermitteln, Pharmazeutika oder Feinchemikalien. Feinchemikalien meint bevorzugt Proteine, Enzyme, Vitamine, Aminosäuren, Zucker, Fettsäuren, natürliche und synthetische Geschmacks-, Aroma- und Farbstoffe.

20

Ferner betrifft die Erfindung Verfahren zur Herstellung von rekombinanten Proteinen, Enzymen (bevorzugt Enzymen mit Nitrilase- und/oder Nitrilhydratase-Aktivität) oder anderen Feinchemikalien wie beispielsweise Amiden oder Carbonsäuren (bevorzugt chiraler Carbonsäuren und Amiden) unter Verwendung einer der erfindungsgemäßen Zubereitung von Mikroorganismen oder einer Präparationen derselben.

25

30

Ein bevorzugter Gegenstand der Erfindung betrifft Verfahren zur Herstellung von Carbonsäuren und/oder Amide (bevorzugt chiraler Carbonsäuren/Amide), umfassend nachfolgende Schritte:

35

- a) Kultivierung eines Mikroorganismus, der mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweist,
- b) Zugabe eines mindestens eines Aldehydes, wobei die Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l liegt,
- 40
- c) Inkontaktbringen der mit Aldehyd versetzten Zubereitung besagter Mikroorganismen mit mindestens einem Nitril und Umsetzung des besagten Nitrils zu einer Carbonsäure und/oder einem Amid.
- 45

## 18

- In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Zubereitung des Mikroorganismus bei der Zugabe des Aldehydes Cyanidverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Nitrilen, Blausäure und Cyanidsalzen, in einer Konzentration, die maximal 10 Mol-% der Gesamtaldehydkonzentration beträgt. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform enthält besagte Zubereitung keine Zusätze an besagten Cyanidverbindungen. In einer weiterhin bevorzugten Ausführungsform kann die Zubereitung nach der Zugabe des Aldehydes (Schritt b) bis zum Einsatz in dem Reaktionsschritt c) gelagert werden. Das erfindungsgemäße Verfahren kann kontinuierlich oder diskontinuierlich in batch- oder fed-batch-weise durchgeführt werden. Dabei kann sowohl die Zubereitung der Mikroorganismen als auch das racemische Nitril als Substrat nachgeführt werden.
- 15 Einzelheiten zu der Durchführung der Umsetzungen bzw. zur Aufreinigung der Produkte etc. sind beispielsweise in WO 00/23577 im Detail beschrieben. Auf die dort als beschriebenen Edukte, Produkte und Verfahrensparameter wird ausdrücklich Bezug genommen.
- 20 In einer weiteren Ausführungsform, kann das Verfahren mit weiteren Verfahren zur Stabilisierung, Konservierung und/oder Lagerung von Enzymen, insbesondere Nitrilasen und/oder Nitrilhydratase kombiniert werden. Derartige Verfahren können beispielhaft jedoch nicht einschränkend umfassen:
- 25 a) Zusatz von mindestens einem anorganischen Salz (bevorzugt ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Phosphaten, Boraten, Sulfaten, Sulfiten und Hydrochloriden) in einer Konzentration von mindestens 100 mM, bevorzugt 300 bis 700 mM.
- 30 b) Zusatz von Metallsalzen, deren Metall kation als prosthetische Gruppe der Nitrilase und/oder Nitrilhydratase fungiert (z.B. Cobaltchlorid oder Eisensulfat).
- 35 c) Zusatz von Nitrilen (z.B. Benzonitril, Isobutyronitril, Succinonitril) und/oder Amiden (s-Caprolactam, Isobutylamid, Propionamid).

## Abbildungen

40

Fig.1: Lagerstabilität einer Nitrilase zur Produktion von (R)-Mandelsäure.

45

Wiedergegeben ist beispielhaft die Abnahme der Aktivität (A; in % der Ausgangsaktivität) von drei unabhängigen Präparationen einer E.coli exprimierten Nitrilase ohne

## 19

Zusatz von Aldehyd (Vergleichsversuche) über einen Zeitraum von bis zu 20 Tagen (d).

Fig.2: Lagerstabilität einer Nitrilase zur Produktion von (R)-Mandelsäure.

Wiedergegeben ist die Abnahme der Aktivität (A; in % der Ausgangsaktivität) von Präparationen einer E.coli exprimierten Nitrilase ohne Zusatz von 2-Chlorbenzaldehyd (offene Kreise) im Vergleich zu einer ansonsten identischen Präparation mit Zusatz von 2-Chlorbenzaldehyd (geschlossene Kreise). Wiedergegeben ist ein Zeitraum (t) von bis zu 32 Tagen (d).

## 15 Beispiele

Allgemeine Nukleinsäureverfahren wie z.B. Klonierung, Restriktionsspaltungen, Agarose-Gelelektrophorese, Verknüpfen von DNA-Fragmenten, Transformation von Mikroorganismen, Anzucht von Bakterien und Sequenzanalyse rekombinanter DNA wurden wenn nichts anderes beschrieben wurde wie bei Sambrook et al. (1989) (Cold Spring Harbor Laboratory Press: ISBN 0-87969-309-6) beschrieben durchgeführt. Die Sequenzierung rekombinanter DNA-Moleküle erfolgte mit einem Laserfluoreszenz-DNA-Sequenzierer der Firma ABI nach der Methode von Sanger (Sanger et al. (1977) Proc Natl Acad Sci USA 74:5463-5467). Fragmente resultierend aus einer Polymerase Kettenreaktion wurden zur Vermeidung von Polymerasefehlern in zu exprimierenden Konstrukten sequenziert und überprüft.

## 30 Beispiel 1: Herstellung von Zellen mit Nitrilaseaktivität:

Die Fermentation des *Escherichia coli* (TG10 pDHE1650 pAgro4 pHSG575) erfolgte im 20 L Bioreaktor. Der Reaktor mit 10 l Arbeitsvolumen wurde mit 200 ml Vorkultur aus Schüttelkolben angeimpft. Das Vorkulturmedium entspricht dem Hauptkulturmedium.

## Medium:

40 g	Glycerin 99,5 %
15 g	Trypton
40 13,3 g	Kaliumdihydrogenphosphat
5 g	Hefeextrakt
4 g	Di-Ammoniumhydrogenphosphat
1,7g	Citronensäure
1,1 g	Magnesiumsulfat Heptahydrat
45 1 ml	Spurenelementlösung SL Korz 1000 C
0,1 ml	Tego KS 911 Antischaummittel
0,062 g	Eisen(II)sulfat Heptahydrat

## 20

10 mg Thiaminhydrochlorid  
ad 1 l VE-Wasser

Das Medium wird 30 min bei 121°C sterilisiert. Anschließend werden  
5 0,1 g Ampicilin steril zugesetzt

## Spurenelementlösung

	Citronensäure*H <sub>2</sub> O		20 g
	Kobalt(II)chlorid Hexachlorid	CoCl <sub>2</sub> * 6H <sub>2</sub> O	2,5 g
10	Mangan(II)chlorid Tetrachlorid	MnCl <sub>2</sub> * 4H <sub>2</sub> O	3,0 g
	Kupfer(II)chlorid Dihydrat	CuCl <sub>2</sub> * 2H <sub>2</sub> O	0,3 g
	Borsäure	H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub>	0,6 g
	Natriummolybdat Dihydrat	Na <sub>2</sub> MoO <sub>4</sub> * 2H <sub>2</sub> O	0,5 g
	Zinkacetat Dihydrat	Zn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> * 2H <sub>2</sub> O	2,6 g
15	ad 1L VE- H <sub>2</sub> O		

## Glycerinfeedlösung

2 L VE-Wasser  
211 g Natriumsulfat  
20 13,6 g Eisen(II)sulfat Heptahydrat  
8,8 kg Glycerin 99,5 %  
220 mL Spurenelementlösung

## Rhamnose-Feedlösung

25 703 g VE-Wasser  
297 g Rhamnose Monohydrat

Die Fermentation erfolgt bei einer Temperatur von 37°C. Die Begasung wird zwischen 8-30 L/min, die Rührerdrehzahl von 400-1500  
30 1/min geregelt um einen pO<sub>2</sub> von 20 % nicht zu unterschreiten. Nach 1 h Fermentationszeit wird die Kultur mit IPTG (0,15 mM) induziert. Anschließend werden 18.5 g Rhamnosefeedlösung zugesetzt. Nach Verbrauch der vorgelegten Glycerinmenge wird kontinuierlich Glycerin zugefüttert. Nach 44 h Fermentationsdauer werden Zell-  
35 suspensionen von 50 g BTM/l und 50 bis 60 kU/l erhalten. Die Zellen werden auf 4°C abgekühlt.

## Beispiel 2: Aktivitätstest

40 Zu 880 µl Natrium-Kalium-Phosphatpuffer (10mM) werden 50 µl Zellsuspension pipettiert und auf 30°C temperiert. Die Reaktion wird durch Zugabe von 20 µl methanolischer Mandelonitrillösung (12 %) gestartet. Nach 10 min wird die Enzymreaktion durch Zugabe von 50 µl 1M HC gestoppt. Die Zellmasse wird abzentrifugiert und die  
45 Mandelsäurekonzentration im Überstand wird per HPLC (ODS Hypersil 100\*2,0 mm, Laufmittel: 75% H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (14,8 mM) / 25% Methanol; Flußrate: 0,5 ml/min; Injektionsvolumen: 2 µl; Säulentemperatur:

## 21

40°C; Detektion: 210nm; Retentionzeit Mandelsäure: 0,9 min) gemessen.

Beispiel 3: Lagerung mit Benzaldehyd:

5

Die Zellsuspension wurde 14 h nach Fermentationsende mit NaOH bzw. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> auf einen pH 6,0, 6,6 bzw 7,2 eingestellt und anschließend mit Benzaldehyd versetzt. Die Proben wurden bei 4°C und 22°C gelagert. die Enzymaktivität wurde 0,6, 3,6 und 6,6 Tage nach

10 Fermentationsende bestimmt.

Lagerung bei 22°C:

15		pH-Wert	Lagerzeit		
			0,6 d	3,6 d	6,6 d
			Aktivität in kU/L		
	ohne Zusatz	7,2	51,0	49,0	48,7
	1 mM Benzaldehyd	7,2	55,8	50,4	48,7
	5 mM Benzaldehyd	7,2	47,1	51,7	52,9
20	10 mM Benzaldehyd	7,2	53,8	52,7	51,3
	ohne Zusatz	6,6	51,5	50,5	50,9
	1 mM Benzaldehyd	6,6	53,2	53,0	53,1
	5 mM Benzaldehyd	6,6	47,1	54,3	58,0
25	10 mM Benzaldehyd	6,6	51,3	49,4	55,4
	ohne Zusatz	6,0	54,8	45,6	44,5
	1 mM Benzaldehyd	6,0	55,1	50,6	51,0
	5 mM Benzaldehyd	6,0	51,8	51,5	54,9
	10 mM Benzaldehyd	6,0	51,3	53,0	49,2

30

Lagerung bei 4°C:

35		pH-Wert	Lagerzeit		
			0,6 d	3,6 d	6,6 d
			Aktivität in kU/L		
	ohne Zusatz	7,2	51,0	48,6	47,8
	1 mM Benzaldehyd	7,2	55,8	46,8	47,5
	5 mM Benzaldehyd	7,2	47,1	48,3	50,7
	10 mM Benzaldehyd	7,2	53,8	51,2	49,2
40					
	ohne Zusatz	6,6	51,5	49,5	45,3
	1 mM Benzaldehyd	6,6	53,2	52,3	52,5
	5 mM Benzaldehyd	6,6	47,1	52,0	55,7
	10 mM Benzaldehyd	6,6	51,3	55,5	51,9
45					
	ohne Zusatz	6,0	54,8	42,8	34,9
	1 mM Benzaldehyd	6,0	55,1	49,9	48,3

## 22

	pH-Wert	Lagerzeit			
		0,6 d	3,6 d	6,6 d	
		Aktivität in kU/L			
5	5 mM Benzaldehyd	6,0	51,8	52,3	53,0
	10 mM Benzaldehyd	6,0	51,3	51,5	50,2

Beispiel 4: Lagerung mit CBA:

- 10 Die Zellsuspension wurde 14h nach Fermentationsende mit NaOH bzw.  $H_2SO_4$  auf einen pH 6,0, 6,6 bzw 7,2 eingestellt und anschließend mit 2-Chlorbenzaldehyd versetzt. Die Proben wurden bei 4°C und 22°C gelagert. Die Enzymaktivität wurde 0,6, 3,6 und 6,6 Tage nach Fermentationsende bestimmt.

15

Lagerung bei 22°C:

20		pH-Wert	Lagerzeit		
			0,6 d	3,6 d	6,6 d
			Aktivität in kU/L		
	ohne Zusatz	7,2	51,0	49,0	48,7
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	51,3	52,8	53,2
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	53,3	51,4	50,1
	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	48,3	52,9	54,0
25	ohne Zusatz	6,6	51,5	50,5	50,9
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	48,8	55,0	57,2
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	50,6	56,7	55,5
	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	47,4	56,2	58,6
30	ohne Zusatz	6,0	54,8	45,6	44,5
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	52,4	53,8	54,5
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	52,5	55,0	59,1
	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	53,5	55,7	52,4

- 35 Lagerung bei 4°C:

40		pH-Wert	Lagerzeit		
			0,6 d	3,6 d	6,6 d
			Aktivität in kU/L		
	ohne Zusatz	7,2	51,0	48,6	47,8
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	51,3	48,3	45,2
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	53,3	51,2	48,1
	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	7,2	48,3	51,0	49,9
45	ohne Zusatz	6,6	51,5	49,5	45,3
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	48,8	55,1	54,7
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	50,6	56,3	53,6

## 23

		pH-Wert	Lagerzeit		
			0,6 d	3,6 d	6,6 d
			Aktivität in kU/L		
5	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,6	47,4	55,0	58,5
	ohne Zusatz	6,0	54,8	42,8	34,9
	1 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	52,4	53,5	56,9
	5 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	52,5	55,6	53,8
10	10 mM 2-Chlorbenzaldehyd	6,0	53,5	55,7	47,6

## Beispiel 5: Langzeitlagerung:

Die Zellsuspension wurde auf pH 6,6 gestellt und anschließend mit  
 15 1,35 mM 2-Chlorbenzaldehyd versetzt und bei 4°C gelagert. Der Verlauf der Aktivität ist in Fig. 2 wiedergegebenen.

20

25

30

35

40

45

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Konservierung und/oder Lagerung von Mikroorganismen, die mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweisen, wobei die Konservierung und/oder Lagerung in einem wässrigen Medium erfolgt, welches mindestens ein Aldehyd umfasst, wobei die Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l liegt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Konservierungsschritt durchgeführt wird, bevor die Zellen mit einem Reaktanten, dessen Reaktion durch die Zellen zu katalysieren ist, versetzt werden.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, wobei das wässrige Medium eine Gesamtkonzentration an Cyanidverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Nitrilen, Blausäure und Cyanidsalzen, enthält, die maximal 10 Mol-% der Gesamtaldehydkonzentration beträgt.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Aldehyd durch die allgemeinen Formel III beschrieben ist
- $$\begin{array}{c} \text{R}^6\text{-C=O} \quad (\text{III}) \\ | \\ \text{H} \end{array}$$
- wobei R<sup>6</sup> substituiertes oder unsubstituiertes, verzweigtes oder unverzweigtes C1-C10-Alkyl-, C2-C10-Alkenyl-, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl- oder Hetaryl- sein kann.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Aldehyd ausgewählt ist aus der Gruppe umfassend unsubstituierten Benzaldehyd und substituierte Benzaldehyde.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Mikroorganismus ausgewählt ist aus den Arten der Enterobacteriaceae oder Nocardiaceae Familie.



## 25

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Mikroorganismus ausgewählt ist aus den Gruppe der Arten Pseudomonas, Burkholderia, Nocardia, Acetobacter, Gluconobacter, Corynebacterium, Brevibacterium, Bacillus, Clostridium, Cyanobacter, Staphylococcus, Aerobacter, Alcaligenes, Rhodococcus und Penicillium.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Verfahren mit mindestens einem weiteren Verfahren zur Stabilisierung, Konservierung und/oder Lagerung von Enzymen kombiniert wird, wobei besagte Verfahren ausgewählt sind aus der Gruppe bestehend aus:
- a) Zusatz von mindestens einem anorganischen Salz in einer Konzentration von mindestens 100 mM;
- b) Zusatz von Metallsalzen, deren Metallkation als prosthetische Gruppe der Nitrilase und/oder Nitrilhydratase fungiert;
- c) Zusatz von Nitrilen und/oder Amiden.
9. Zubereitung von Mikroorganismen, die mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweisen, wobei die Zubereitung umfasst
- a) mindestens ein Aldehyd mit einer Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l, und
- b) Cyanidverbindungen ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Nitrilen, Blausäure und Cyanidsalzen, in einer Gesamtkonzentration, die maximal 10 Mol-% der Gesamtaldehydkonzentration beträgt.
10. Zubereitung von Mikroorganismen nach Anspruch 9, wobei besagte Zubereitung keine Zusätze an Cyanidverbindungen enthält.
11. Verwendung einer Zubereitung von Mikroorganismen nach Anspruch 9 oder 10 zur Herstellung von Nahrungs- oder Futtermitteln, Pharmazeutika oder Feinchemikalien.
12. Verfahren zur Herstellung von rekombinanten Proteinen, Enzymen oder Feinchemikalien unter Verwendung einer Zubereitung von Mikroorganismen nach Anspruch 9 oder 10 oder einer Präparationen derselben.

## 26

13. Verfahren zur Herstellung von Carbonsäuren und/oder Amide umfassend nachfolgende Schritte:

- 5           a) Kultivierung eines Mikroorganismus, der mindestens eine Nitrilhydratase- oder Nitrilase-Enzymaktivität aufweist,
- b) Zugabe eines mindestens eines Aldehydes, wobei die Gesamtaldehydkonzentration in einem Bereich von 0,1 bis 100 mM/l liegt,
- 10           c) Inkontaktbringen der mit Aldehyd versetzten Zubereitung besagter Mikroorganismen mit mindestens einem Nitril und Umsetzung des besagten Nitrils zu einer Carbonsäure und/oder einem Amid.

15

20

25

30

35

40

45




Fig. 1




Fig. 2

## SEQUENZPROTOKOLL

&lt;110&gt; BASF Aktiengesellschaft

<120> Verfahren zur Konservierung und/oder Lagerung von  
Zellen mit Nitrilase oder Nitrilhydratase-Aktivität

&lt;130&gt; AE20020980

&lt;140&gt;

&lt;141&gt;

&lt;160&gt; 2

&lt;170&gt; PatentIn Ver. 2.1

&lt;210&gt; 1

&lt;211&gt; 1071

&lt;212&gt; DNA

<213> *Alcaligenes faecalis*

&lt;220&gt;

&lt;221&gt; CDS

&lt;222&gt; (1)..(1068)

&lt;223&gt; coding for nitrilase

&lt;400&gt; 1

atg	cag	aca	aga	aaa	atc	gtc	cgg	gca	gcc	gcc	gta	cag	gcc	gcc	tct	48
Met	Gln	Thr	Arg	Lys	Ile	Val	Arg	Ala	Ala	Ala	Val	Gln	Ala	Ala	Ser	
1				5					10				15			
ccc	aac	tac	gat	ctg	gca	acg	ggg	gtt	gat	aaa	acc	att	gag	ctg	gct	96
Pro	Asn	Tyr	Asp	Leu	Ala	Thr	Gly	Val	Asp	Lys	Thr	Ile	Glu	Leu	Ala	
			20					25					30			
cgt	cag	gcc	cgc	gat	gag	ggc	tgt	gac	ctg	atc	gtg	ttt	ggg	gaa	acc	144
Arg	Gln	Ala	Arg	Asp	Glu	Gly	Cys	Asp	Leu	Ile	Val	Phe	Gly	Glu	Thr	
			35				40					45				
tgg	ctg	ccc	gga	tat	ccc	ttc	cac	gtc	tgg	ctg	ggc	gca	ccg	gcc	tgg	192
Trp	Leu	Pro	Gly	Tyr	Pro	Phe	His	Val	Trp	Leu	Gly	Ala	Pro	Ala	Trp	
	50					55					60					
tcg	ctg	aaa	tac	agt	gcc	cgc	tac	tat	gcc	aac	tcg	ctc	tcg	ctg	gac	240
Ser	Leu	Lys	Tyr	Ser	Ala	Arg	Tyr	Tyr	Ala	Asn	Ser	Leu	Ser	Leu	Asp	
	65				70					75					80	
agt	gca	gag	ttt	caa	cgc	att	gcc	cag	gcc	gca	cgg	acc	ttg	ggg	att	288
Ser	Ala	Glu	Phe	Gln	Arg	Ile	Ala	Gln	Ala	Ala	Arg	Thr	Leu	Gly	Ile	
				85				90						95		
ttc	atc	gca	ctg	ggg	tat	agc	gag	cgc	agc	ggc	ggc	agc	ctt	tac	ctg	336
Phe	Ile	Ala	Leu	Gly	Tyr	Ser	Glu	Arg	Ser	Gly	Gly	Ser	Leu	Tyr	Leu	
			100					105					110			
ggc	caa	tgc	ctg	atc	gac	gac	aag	ggc	gag	atg	ctg	tgg	tcg	cgt	cgc	384
Gly	Gln	Cys	Leu	Ile	Asp	Asp	Lys	Gly	Glu	Met	Leu	Trp	Ser	Arg	Arg	
		115					120					125				
aaa	ctc	aaa	ccc	acg	cat	gta	gag	cgc	acc	gta	ttt	ggg	gaa	ggg	tat	432
Lys	Leu	Lys	Pro	Thr	His	Val	Glu	Arg	Thr	Val	Phe	Gly	Glu	Gly	Tyr	
	130					135					140					
gcc	cgt	gat	ctg	att	gtg	tcc	gac	aca	gaa	ctg	gga	cgc	gtc	ggg	gct	480
Ala	Arg	Asp	Leu	Ile	Val	Ser	Asp	Thr	Glu	Leu	Gly	Arg	Val	Gly	Ala	
	145				150					155					160	
cta	tgc	tgc	tgg	gag	cat	ttg	tcg	ccc	ttg	agc	aag	tac	gcg	ctg	tac	528
Leu	Cys	Cys	Trp	Glu	His	Leu	Ser	Pro	Leu	Ser	Lys	Tyr	Ala	Leu	Tyr	
				165					170					175		

```

tcc cag cat gaa gcc att cac att gct gcc tgg ccg tcg ttt tcg cta 576
Ser Gln His Glu Ala Ile His Ile Ala Ala Trp Pro Ser Phe Ser Leu
180 185 190

tac agc gaa cag gcc cac gcc ctc agt gcc aag gtg aac atg gct gcc 624
Tyr Ser Glu Gln Ala His Ala Leu Ser Ala Lys Val Asn Met Ala Ala
195 200 205

tcg caa atc tat tcg gtt gaa ggc cag tgc ttt acc atc gcc gcc agc 672
Ser Gln Ile Tyr Ser Val Glu Gly Gln Cys Phe Thr Ile Ala Ala Ser
210 215 220

agt gtg gtc acc caa gag acg cta gac atg ctg gaa gtg ggt gaa cac 720
Ser Val Val Thr Gln Glu Thr Leu Asp Met Leu Glu Val Gly Glu His
225 230 235 240

aac gcc ccc ttg ctg aaa gtg ggc ggc ggc agt tcc atg att ttt gcg 768
Asn Ala Pro Leu Leu Lys Val Gly Gly Gly Ser Ser Met Ile Phe Ala
245 250 255

ccg gac gga cgc aca ctg gct ccc tac ctg cct cac gat gcc gag ggc 816
Pro Asp Gly Arg Thr Leu Ala Pro Tyr Leu Pro His Asp Ala Glu Gly
260 265 270

ttg atc att gcc gat ctg aat atg gag gag att gcc ttc gcc aaa gcg 864
Leu Ile Ile Ala Asp Leu Asn Met Glu Glu Ile Ala Phe Ala Lys Ala
275 280 285

atc aat gac ccc gta ggc cac tat tcc aaa ccc gag gcc acc cgt ctg 912
Ile Asn Asp Pro Val Gly His Tyr Ser Lys Pro Glu Ala Thr Arg Leu
290 295 300

gtg ctg gac ttg ggg cac cga gac ccc atg act cgg gtg cac tcc aaa 960
Val Leu Asp Leu Gly His Arg Asp Pro Met Thr Arg Val His Ser Lys
305 310 315 320

agc gtg acc agg gaa gag gct ccc gag caa ggt gtg caa agc aag att 1008
Ser Val Thr Arg Glu Glu Ala Pro Glu Gln Gly Val Gln Ser Lys Ile
325 330 335

gcc tca gtc gct atc agc cat cca cag gac tcg gac aca ctg cta gtg 1056
Ala Ser Val Ala Ile Ser His Pro Gln Asp Ser Asp Thr Leu Leu Val
340 345 350

caa gag ccg tct tga 1071
Gln Glu Pro Ser
355

```

&lt;210&gt; 2

&lt;211&gt; 356

&lt;212&gt; PRT

<213> *Alcaligenes faecalis*

&lt;400&gt; 2

```

Met Gln Thr Arg Lys Ile Val Arg Ala Ala Ala Val Gln Ala Ala Ser
1 5 10 15

Pro Asn Tyr Asp Leu Ala Thr Gly Val Asp Lys Thr Ile Glu Leu Ala
20 25 30

Arg Gln Ala Arg Asp Glu Gly Cys Asp Leu Ile Val Phe Gly Glu Thr
35 40 45

Trp Leu Pro Gly Tyr Pro Phe His Val Trp Leu Gly Ala Pro Ala Trp
50 55 60

Ser Leu Lys Tyr Ser Ala Arg Tyr Tyr Ala Asn Ser Leu Ser Leu Asp
65 70 75 80

```

Ser Ala Glu Phe Gln Arg Ile Ala Gln Ala Ala Arg Thr Leu Gly Ile  
                                     85                                    90                                    95  
 Phe Ile Ala Leu Gly Tyr Ser Glu Arg Ser Gly Gly Ser Leu Tyr Leu  
                                     100                                    105                                    110  
 Gly Gln Cys Leu Ile Asp Asp Lys Gly Glu Met Leu Trp Ser Arg Arg  
                                     115                                    120                                    125  
 Lys Leu Lys Pro Thr His Val Glu Arg Thr Val Phe Gly Glu Gly Tyr  
                                     130                                    135                                    140  
 Ala Arg Asp Leu Ile Val Ser Asp Thr Glu Leu Gly Arg Val Gly Ala  
                                     145                                    150                                    155                                    160  
 Leu Cys Cys Trp Glu His Leu Ser Pro Leu Ser Lys Tyr Ala Leu Tyr  
                                     165                                    170                                    175  
 Ser Gln His Glu Ala Ile His Ile Ala Ala Trp Pro Ser Phe Ser Leu  
                                     180                                    185                                    190  
 Tyr Ser Glu Gln Ala His Ala Leu Ser Ala Lys Val Asn Met Ala Ala  
                                     195                                    200                                    205  
 Ser Gln Ile Tyr Ser Val Glu Gly Gln Cys Phe Thr Ile Ala Ala Ser  
                                     210                                    215                                    220  
 Ser Val Val Thr Gln Glu Thr Leu Asp Met Leu Glu Val Gly Glu His  
                                     225                                    230                                    235                                    240  
 Asn Ala Pro Leu Leu Lys Val Gly Gly Gly Ser Ser Met Ile Phe Ala  
                                     245                                    250                                    255  
 Pro Asp Gly Arg Thr Leu Ala Pro Tyr Leu Pro His Asp Ala Glu Gly  
                                     260                                    265                                    270  
 Leu Ile Ile Ala Asp Leu Asn Met Glu Glu Ile Ala Phe Ala Lys Ala  
                                     275                                    280                                    285  
 Ile Asn Asp Pro Val Gly His Tyr Ser Lys Pro Glu Ala Thr Arg Leu  
                                     290                                    295                                    300  
 Val Leu Asp Leu Gly His Arg Asp Pro Met Thr Arg Val His Ser Lys  
                                     305                                    310                                    315                                    320  
 Ser Val Thr Arg Glu Glu Ala Pro Glu Gln Gly Val Gln Ser Lys Ile  
                                     325                                    330                                    335  
 Ala Ser Val Ala Ile Ser His Pro Gln Asp Ser Asp Thr Leu Leu Val  
                                     340                                    345                                    350  
 Gln Glu Pro Ser  
                                     355

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP 03/14880

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 C12N1/04 C12N9/96 C12N9/78 C12N9/88

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 C12N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS Data, PASCAL

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 900 672 A (YAMADA HIDEAKI ET AL) 13 February 1990 (1990-02-13) cited in the application column 2, line 65 - column 3, line 42; claim 5; table 3	1-4, 6-13
X	US 3 779 869 A (ZIENTY M) 18 December 1973 (1973-12-18) claim 1; examples 1,2	1-4
X	DE 198 48 129 A (BASF AG) 20 April 2000 (2000-04-20) page 5, line 13 - line 18; claim 12	13
A	US 4 950 596 A (CHENG ROBERTA C ET AL) 21 August 1990 (1990-08-21) column 5, line 36 - line 41	1-13

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 May 2004

Date of mailing of the international search report

02/06/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lanzrein, M.



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/14880

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4900672	A	13-02-1990	JP 1842689 C	12-05-1994
			JP 5043351 B	01-07-1993
			JP 62257386 A	09-11-1987
			DE 3787194 D1	07-10-1993
			DE 3787194 T2	31-03-1994
			EP 0243966 A2	04-11-1987
US 3779869	A	18-12-1973	AU 3981372 A	10-05-1973
			BE 783410 A1	01-09-1972
			CA 978113 A1	18-11-1975
			DE 2223340 A1	23-11-1972
			DK 130652 B	17-03-1975
			FR 2137869 A5	29-12-1972
			GB 1376983 A	11-12-1974
			IL 38923 A	22-10-1974
			IT 1046202 B	30-06-1980
			JP 56022514 B	26-05-1981
			LU 65327 A1	23-08-1972
			NL 7205718 A , B	15-11-1972
			NO 135424 B	27-12-1976
DE 19848129	A	20-04-2000	DE 19848129 A1	20-04-2000
			AU 765480 B2	18-09-2003
			AU 6470899 A	08-05-2000
			BR 9914629 A	26-06-2001
			CA 2347521 A1	27-04-2000
			CN 1331743 T	16-01-2002
			CZ 20011382 A3	13-03-2002
			EE 200100232 A	15-08-2002
			WO 0023577 A1	27-04-2000
			EP 1123386 A1	16-08-2001
			HU 0104802 A2	29-04-2002
			ID 29136 A	02-08-2001
			JP 2002527106 T	27-08-2002
			NO 20011912 A	18-04-2001
			ZA 200104066 A	01-07-2002
US 4950596	A	21-08-1990	CA 1267618 A1	10-04-1990
			DK 85086 A	05-09-1986
			EP 0195304 A2	24-09-1986
			JP 61234781 A	20-10-1986

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14880

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 C12N1/04 C12N9/96 C12N9/78 C12N9/88

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 C12N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, BIOSIS, EMBASE, CHEM ABS Data, PASCAL

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 900 672 A (YAMADA HIDEAKI ET AL) 13. Februar 1990 (1990-02-13) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 65 - Spalte 3, Zeile 42; Anspruch 5; Tabelle 3	1-4, 6-13
X	US 3 779 869 A (ZIENY M) 18. Dezember 1973 (1973-12-18) Anspruch 1; Beispiele 1, 2	1-4
X	DE 198 48 129 A (BASF AG) 20. April 2000 (2000-04-20) Seite 5, Zeile 13 - Zeile 18; Anspruch 12	13
A	US 4 950 596 A (CHENG ROBERTA C ET AL) 21. August 1990 (1990-08-21) Spalte 5, Zeile 36 - Zeile 41	1-13

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

24. Mai 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

02/06/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lanzrein, M

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/14880

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4900672	A	13-02-1990	JP 1842689 C 12-05-1994
			JP 5043351 B 01-07-1993
			JP 62257386 A 09-11-1987
			DE 3787194 D1 07-10-1993
			DE 3787194 T2 31-03-1994
			EP 0243966 A2 04-11-1987
US 3779869	A	18-12-1973	AU 3981372 A 10-05-1973
			BE 783410 A1 01-09-1972
			CA 978113 A1 18-11-1975
			DE 2223340 A1 23-11-1972
			DK 130652 B 17-03-1975
			FR 2137869 A5 29-12-1972
			GB 1376983 A 11-12-1974
			IL 38923 A 22-10-1974
			IT 1046202 B 30-06-1980
			JP 56022514 B 26-05-1981
			LU 65327 A1 23-08-1972
			NL 7205718 A , B 15-11-1972
			NO 135424 B 27-12-1976
DE 19848129	A	20-04-2000	DE 19848129 A1 20-04-2000
			AU 765480 B2 18-09-2003
			AU 6470899 A 08-05-2000
			BR 9914629 A 26-06-2001
			CA 2347521 A1 27-04-2000
			CN 1331743 T 16-01-2002
			CZ 20011382 A3 13-03-2002
			EE 200100232 A 15-08-2002
			WO 0023577 A1 27-04-2000
			EP 1123386 A1 16-08-2001
			HU 0104802 A2 29-04-2002
			ID 29136 A 02-08-2001
			JP 2002527106 T 27-08-2002
			NO 20011912 A 18-04-2001
			ZA 200104066 A 01-07-2002
US 4950596	A	21-08-1990	CA 1267618 A1 10-04-1990
			DK 85086 A 05-09-1986
			EP 0195304 A2 24-09-1986
			JP 61234781 A 20-10-1986